

ANVÄNDARINFORMATION

1 LÄKEMEDLETS NAMN, LÄKEMEDELSFORM OCH STYRKA

Gericomplex tabletter

2 VAD INNEHÅLLER GERICOMPLEX?

En tablett innehåller:

Extrakt (G115) från ginsengrot (Panax ginseng C.A. Meyer), 40 mg.

Extraktet innehåller även 43-68% laktosmonohydrat och 2% kolloidal, vattenfri kiseldioxid.

Betakaroten motsvarande 2667 IE vitamin A, kolekalciferol motsvarande 200 IE vitamin D3, DL-alfatokoferolacetat motsvarande 10 mg vitamin E, tiaminnitrat (vitamin B1) 1,4 mg, riboflavin (vitamin B2) 1,6 mg, nikotinamid (vitamin B3) 18 mg, pyridoxinhydroklorid (vitamin B6) 2 mg, cyanokobalamin (vitamin B12) 1 µg, askorbinsyra (vitamin C) 60 mg, folsyra 0,2 mg, biotin 150 µg, järn-II-sulfat motsvarande järn 10 mg, zinksulfatmonohydrat motsvarande zink 1 mg, koppar-II-sulfat vattenfri motsvarande koppar 2 mg, mangan-II-sulfatmonohydrat motsvarande mangan 2,5 mg, magnesiumoxid motsvarande magnesium 40 mg, vattenfri kalciumvätefosfat motsvarande kalcium 100 mg, vattenfri natriumselenit motsvarande selen 50 µg.

Övrigt innehåll:

Gelatin, sackaros, majsstärkelse, jordnötsolja, delvis härdad sojaolja, DL-alfatokoferol, askorbylpalmitat, mannitol, maltodextrin, kalciumvätefosfatdihydrat, mono- och diglycerider av fettsyror, povidon, mikrokristallin cellulosa, vattenfri kolloidal kiseldioxid, krospovidon, magnesiumstearat, hypromellos, trietylcitrat, talk, titandioxid (E171), brun järnoxid (E172), röd järnoxid (E172).

Vid tillverkning av en tablett åtgår 87 mg växt drog (rot).

3 HUR VERKAR GERICOMPLEX?

Verkningsmekanismen är ofullständigt känd. Ginsenosider anses i allmänhet vara de huvudsakligen aktiva komponenterna i ginseng. Resultat från humanstudier med ginsengextraktet G115 tyder på effekt på psykomotoriska funktioner och mental kapacitet.

4 INNEHAVARE AV FÖRSÄLJNINGSTILLSTÅND

Boehringer Ingelheim International GmbH
Postfach 200
D-55216 Ingelheim
Tyskland

Information lämnas av:

Boehringer Ingelheim AB
Consumer Health Care
Box 47608
117 94 Stockholm
Tel: 08-721 21 00
Fax: 08-721 21 88
E-post: info@receptfritt.nu

5 VAD ANVÄNDS GERICOMPLEX FÖR?

Traditionellt använt som stärkande medel vid nedsatt prestationsförmåga som trötthet och svaghetskänsla.

6 NÄR SKA GERICOMPLEX INTE ANVÄNDAS?

Vid onormala mängder av kalcium i kroppen, t.ex. för mycket kalcium i blodet eller i urinen. Vid för höga halter av A- eller D-vitamin i kroppen. Vid nedsatt njurfunktion. Vid behandling med vitamin D eller (ämnen som liknar) vitamin A. Vid känd överkänslighet mot något innehållsämne.

ATT TÄNKA PÅ INNAN OCH NÄR GERICOMPLEX ANVÄNDS:

Dagsdosen får inte överskridas och preparatet bör inte tas samtidigt med andra preparat som innehåller vitamin A, vitamin D, selen eller järn.

Det har ej studerats om speciella medicinska tillstånd såsom nedsatt leverfunktion eller andra sjukdomar innebär att försiktighet bör iakttas vid behandling.

GRAVIDITET

Användning under graviditet kan inte rekommenderas.

AMNING

Användning under amning kan inte rekommenderas.

TRAFIKVARNING

-

VAD SKALL DU UNDVIKA NÄR DU ANVÄNDER GERICOMPLEX?

Effekten av samtidigt intag av andra naturläkemedel, läkemedel eller föda är inte studerad.

7 HUR SKALL DU ANVÄNDA GERICOMPLEX?

Vuxna och barn över 12 år:

1 tablett dagligen i samband med måltid.

Rekommenderas ej till barn under 12 år.

VAD HÄNDER OM DU TAGIT FÖR STOR DOS?

Om du fått i dig för stor mängd av preparatet kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen, telefonnummer 112. Kraftig överdosering orsakar buksmärtor, kräkningar, huvudvärk, dåsighet och diarré.

Symtom på överdosering av selen är vitlöksdoftande andedräkt samt hår- och nagelförändringar.

8 VILKA BIVERKNINGAR KAN GERICOMPLEX GE?

Magbesvär såsom illamående och diarré. Insomningsproblem. I sällsynta fall kan allergiska hudreaktioner förekomma. Kontakta läkare om Du misstänker att Gericomplex gett Dig allvarliga biverkningar.

9 HUR SKA GERICOMPLEX FÖRVARAS?

Förvaras i rumstemperatur, högst 25°C.

Förvaras oåtkomligt för barn.

10 VILKEN HÅLLBARHET HAR GERICOMPLEX?

Används före det utgångsdatum som finns angivet på förpackningen.

11 DATUM FÖR SENASTE REVIDERING AV BIPACKSEDELN

2004-04-22